

# AVERTISSEMENTS AGRICOLES

BULLETIN  
TECHNIQUE  
DES  
STATIONS  
D'AVERTISSEMENTS  
AGRICOLES

PUBLICATION PÉRIODIQUE

DLP 26-3-74 730654

## ÉDITION DE LA STATION DE LA RÉGION PARISIENNE

PARIS, HAUTS DE SEINE, SEINE ST DENIS, VAL DE MARNE, ESSONNE, VAL D'OISE, YVELINES, SEINE ET MARNE

RÉGISSEUR RECETTES-AVANCES - D.D.A. PROTECTION DES VÉGÉTAUX, 47 Rue Paul-Doumer, 93100 MONTREUIL s/BOIS - 287 76-71

C. C. P. PARIS 9063-96

BULLETIN N° 4 - 19 MARS 1974

ABONNEMENT ANNUEL

30 F.

CULTURES FRUITIÈRES

### TAVELURE DU POIRIER

Les premiers périthèces arrivent à maturité. Des projections d'ascospores sont donc à craindre au cours des prochaines pluies. Il est probable que les risques de projection iront en s'intensifiant si le temps pluvieux et doux persiste.

Toutes les variétés ayant atteint le stade C3 devront donc être protégées dès que possible. Pour les variétés plus tardives, il faudra intervenir dès l'apparition de ce stade.

### TAVELURE DU POMMIER

Les périthèces proches de la maturité sont encore rares. Les variétés de pommiers n'ont pas encore atteint le stade de début de la sensibilité (C - C3). Toutefois, si les conditions climatiques restent favorables, il y a lieu de penser que la maturité des périthèces va se poursuivre et que des projections seront possibles quand le stade C3 des variétés hâtives sera atteint.

NOTE : Avec une température moyenne de 10-12° il faut de 12 à 14 heures d'humectation pour entraîner une contamination faible, 16 à 19 heures pour une contamination moyenne. Par contre à 6-8° il faut respectivement 18 à 25 heures et 24 à 35 heures.

MONILIA DES ARBRES FRUITIERS à NOYAU : Par suite du temps très humide il y a lieu de renouveler les traitements.

### CULTURES LÉGUMIÈRES

PUCERONS SUR FRAISIER : Si les températures douces persistent, il faudra dans les cultures sous abri, surveiller les plants et intervenir éventuellement avec un aphicide systémique autorisé en cultures légumières.

- Formothion : Anthio.
  - Mévinphos : Phosdrin, Phosdritox, Phosphène, Phoslit, Phostémique, Vinyphox,
- aux doses recommandées par les fabricants.

L'Ingénieur et le Technicien chargés des  
Avertissements Agricoles  
H. SIMON et R. MERLING

L'Ingénieur en Chef d'Agronomie  
Chef de la Circonscription  
R. SARRAZIN